OBESIMED®

Dispositivo médico / Medical device CE 0086

Previne o peso excessivo, e o comportamento alimentar excessivo
Ajuda a adoptar hábitos alimentares equilibrados
Para uma perda de peso substancial e tratamento da obesidade

Conselhos gerais: Leia atentamente o folheto informativo antes de utilizar Obesimed® mesmo tendo já utilizado este dispositivo médico anteriormente. A informação pode ter sido adaptada aos últimos conhecimentos e dados. Conserve este folheto informativo, poderá ser necessário voltar a lê-lo.

Aplicação: Obesimed® é um dispositivo médico para o tratamento de excesso de peso, ligeiro a extremo (obesidade), em adultos e crianças. A utilização de Obesimed® previne um comportamento alimentar excessivo, ajuda a adoptar hábitos alimentares equilibrados e conduz a uma perda de peso substancial. Obesimed® absorve grandes quantidades de água e forma uma substância natural que enche o estômago. Proporciona assim uma sensação de plenitude gástrica (estômago cheio) diminuindo o apetite antes e depois das refeições. Deste modo diminui a sensação de fome, previne o excesso de peso e contribui para uma mudança positiva nos hábitos alimentares.

Dosagem e utilização: Obesimed® não deve ser utilizado num período de tratamento superior a 30 dias. O tratamento pode ser retomado após 4 dias de interrupção.
As cápsulas devem ser ingeridas inteiras. Durante o período de utilização de Obesimed® deve completar a sua alimentação diária com um preparado de vitaminas e minerais de A a Z com um aporte nutricional recomendado de 100%.
Adultos: Ingerir 3 x por dia 2 cápsulas 1 hora antes das refeições com 2 copos de água (± 500 ml).
Crianças a partir de 10 anos: Ingerir 2 - 3 x por dia 2 cápsulas 1 hora antes das refeições com 2 copos de água (± 500 ml).

Não ultrapassar a dosagem diária recomendada.

Composição: O produto é composto por ingredientes vegetais: OMTEC 19®, Amylum Solani, Hipromelose (E464), Oleum Helianthus, Dióxido de titânio (E171).

O produto pode ser utilizado por vegetarianos.

Alergenos: Este produto não contém alergenos.

A utilização durante a gravidez e/ ou aleitamento: Durante a gravidez e/ ou aleitamento é desaconselhável emagrecer, uma vez que possíveis substâncias nocivas do tecido adiposo podem chegar à criança. A utilização de Obesimed® é, por conseguinte, desaconselhada.

A utilização em combinação com medicamentos: Obesimed® reduz o nível de glucose no sangue. A utilização em combinação com outros suplementos ou medicamentos com um efeito hipoglicémico similar é, por conseguinte, desaconselhada. Os medicamentos orais devem ser ingeridos 1 hora antes ou 4 horas após a utilização de Obesimed®.

Advertências:
- Obesimed® não deve ser utilizado em caso de hipersensibilidade a um ou vários constituintes da formulação. Em caso de dúvida se pode utilizar Obesimed® ou se o pode utilizar em combinação com outro medicamento, consulte o seu médico ou farmacêutico.
- Atenção! Não abrir a cápsula antes de ingerir.
- Manter fora do alcance e da vista das crianças.
- A utilização por crianças com idade superior a 10 anos deverá ser feita apenas sob a supervisão rigorosa de um adulto.

Possíveis efeitos secundários: Obesimed® é bem tolerado e tem poucos efeitos secundários. No entanto, podem surgir problemas gástricos e intestinais, tais como ligeira diarreia, regurgitação e formação de gases durante a utilização de Obesimed®. Geralmente, estes efeitos secundários desaparecem após alguns dias. Consulte o seu médico, se os problemas persistirem mais de 3 dias.

Peso líquido total: 45 cápsulas de 40 gramas, 135 cápsulas de 121 gramas, 895 mg por cápsula.

Modo de conservação: Conservar em temperatura ambiente (15-25°C) num local seco e protegido da luz na embalagem original.

Dispositivo médico: A produção é efectuada em conformidade com as exigências de qualidade rigorosas previstas pela norma ISO 13485: 2003. Obesimed® é um dispositivo médico de classe IIa conforme a directiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos.

A linha de informação Obesimed®: Para questões específicas sobre este dispositivo médico, por favor, contacte a linha de informação Obesimed: ✆ Número verde +351 800 91 91 10. Este número de informação especial encontra-se disponível das 9h às 18h.

Data limite de utilização: A utilização de Obesimed® é desaconselhada após "o prazo de validade inscrito" na embalagem.

Data da última revisão do presente folheto informativo: Junho de 2009 IFU OB06-09

Fabricante: PK Benelux I Pharma Care BV, Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL

Distr. Excl. Portugal: MediRex Pharma
Rua Carlos Calisto 4/C - 1400-043 Lisboa
Telf-+351-213014472

www.obesimed.pt

OBESIMED®

Dispositivo médico / Medical device CE 0086

Evita el sobrepeso extremo y un comportamiento exagerado en la alimentación
Colabora a conseguir un patrón de alimentación equilibrado
Para una pérdida sustancial de peso y el tratamiento de la obesidad

Recomendaciones: Lea el prospecto cuidadosamente antes de utilizar Obesimed®, incluso si ya ha utilizado este dispositivo médico previamente. La información puede haberse modificado en función de los últimos datos y nociones cuando haya adquirido un nuevo paquete. Conserve este prospecto, le podrá ser útil si desea volver a leerlo.

Indicaciones: Obesimed® es un dispositivo médico para el tratamiento de sobrepeso ligero a extremo (obesidad) en adultos y niños. El uso de Obesimed® evita un comportamiento alimenticio exagerado, apoya un patrón de alimentación equilibrado y conduce a una pérdida sustancial de peso. Obesimed® absorbe grandes cantidades de agua y constituye una sustancia natural que llena el estómago. Esto proporciona una sensación de plenitud que sacia durante la comida y el periodo posterior a ella. Fomenta la sensación de llenado del estómago por lo que se evita el sobrepeso extremo y se adquiere otro patrón alimenticio.

Dosificación y uso: Obesimed® se debe utilizar en menos de 30 días en un periodo de tratamiento. Después de 4 días se puede continuar el tratamiento. Tome la cápsula entera. Durante el proceso de adelgazamiento y el uso de Obesimed® deberá completar la alimentación diaria con un preparado de vitaminas y minerales de A a la Z con 100% de ADH.
Adultos: 3 días, 2 cápsulas una hora antes de la comida con dos vasos grandes de agua (+/- 500 ml)
Niños de 10 años en adelante: 2 a 3 días, 2 cápsulas una hora antes de la comida con dos vasos grandes de agua (+/- 500 ml)

No superar la dosis diaria recomendada.

Composición: El producto se basa en ingredientes de plantas: OMTEC 19®, Amylum Solani, Hypromellose (E464), Oleum Helianthus, Titaniumdioxide (E171).

El producto es apto para vegetarianos.

General: Este producto no contiene alergénicos.

Uso durante el embarazo y/o la lactancia: Durante el embarazo o la lactancia se desaconseja adelgazar: algunas sustancias potencialmente peligrosas del tejido adiposo podrían ir a parar al niño. Por este motivo se desaconseja utilizar Obesimed® en estos periodos.

Uso en combinación con medicamentos: Obesimed® reduce el nivel de glucosa en sangre. Por este motivo se desaconseja utilizarlo en combinación con otros suplementos/medicamentos dietéticos que tengan un efecto hipoglucémico semejante. Las medicinas de administración oral se deben tomar 1 hora antes o 4 horas después de usar Obesimed®.

Advertencias:
- Obesimed® no se puede utilizar en caso de hipersensibilidad a uno o varios de sus componentes. En caso de dudar si puede utilizar Obesimed® y/o ingerirlo en combinación de otro medicamento, consulte a su médico o farmacéutico.
- ¡Atención! No abrir la cápsula antes de la ingesta.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- El uso para niños debe realizarse únicamente bajo control de un adulto.

Posibles efectos secundarios: Obesimed® se acepta bien y tienen pocos efectos secundarios. A pesar de todo podrían surgir ligeros problemas de estómago e intestino como diarrea, eructos y gases al utilizar Obesimed®. En general estos efectos secundarios desaparecen después de unos días. Consulte a su médico en caso de que las molestias continúen más de 3 días.

Peso neto total: 45 cápsulas, 40 gramos; 135 cápsulas, 121 gramos; por cápsula 895 mg.

Modo de almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente (15-25 ºC) en lugar seco y oscuro, en el envase original.

Dispositivo médico: La producción se realiza según estrictas normas de calidad en virtud de la ISO 13485: 2003. Obesimed® es un dispositivo médico de clase lla que cumple con la directriz de dispositivos médicos 93/42/CEE.

La línea de información Obesimed®: Para consultas específicas sobre este dispositivo médico, llame a la línea de información Obesimed: ✆ +351 800 91 91 10. Este número de información especial está abierto durante las horas de oficina. (9h-18h)

Fecha de caducidad: Se desaconseja utilizar Obesimed® tras la fecha que aparece en el envase tras "no consumir a partir de".

Fecha en la que se revisó este manual de instrucciones por última vez: Junio del 2009 IFU OB06-09

Fabricante: PK Benelux I Pharma Care BV, Vluchtoord 17, 5406 XP Uden, NL

Distr. Excl. Portugal: MediRex Pharma
Rua Carlos Calisto 4/C - 1400-043 Lisboa
Telf-+351-213014472

www.obesimed.pt